

SOJA



A LAS MALEZAS, GANALES DE MANO



HERBICIDA

Dinamic[®]

70 WDG



¿QUÉ ES DINAMIC 70 WDG?

Herbicida para aplicaciones en barbechos químicos de soja.

Para el control preemergente de malezas de hoja ancha.

Grupo Triazolinona/ Inhibidor del fotosistema II.

Composición: Amicarbazone 70% p/p

Formulación: gránulos dispersables en agua.

Packaging: 4 bolsas de 5 kg en cajas de 20 kg.

Clase III- Banda azul.

BENEFICIOS DEL USO DE DINAMIC

Excelente control preemergente de Yuyo colorado y Rama negra, con cierta acción postemergente en esta última.

Excelente persistencia de acción, controla los sucesivos flujos de nacimientos.

Se activa con baja humedad en el suelo.

No queda retenido en los residuos de cosecha, traspasa las densas coberturas de rastrojo.

Alta estabilidad frente a factores ambientales adversos (sequía, altas temperaturas, elevada radiación).

Ideal para superponer tratamientos residuales bajando el banco de semilla de Yuyo colorado.

Excelente fit con otros modos de acción.

MOMENTO DE APLICACIÓN Y DOSIS POR TIPO DE SUELO

MOMENTO DE APLICACIÓN

Barbecho químico intermedio en rotación al cultivo de soja
(45 días antes de la siembra)

En preemergencia de las malezas y post-emergencia temprana
de Rama Negra (cotiledones a 4 hojas) (*)

DOSIS

Suelo de textura media (franco a franco-limoso):
320 g/ha

Suelo pesado (franco arcilloso a franco limo arcilloso):
400 g/ha

(*) Para aplicaciones sobre malezas emergidas agregue siempre un Coadyuvante siliconado a razón de 25 - 50 ml cada 100 litros de agua o Aceite vegetal metoxilado o parafínico al 0,5% o 500 ml cada 100 litros de agua.

OTRAS RECOMENDACIONES:

En siembras convencionales aplicar Dinamic 70 WDG antes de remover el suelo para incorporarlo mecánicamente.

En suelos pesados, se requieren lluvias mayores a 10 mm para su incorporación.

No aplicar en suelos con más de 50% de arena y menos de 2% de materia orgánica.

No aplicar con vientos mayores a 10 km/h.

Lluvias extremadamente fuertes después de una aplicación, pueden ocasionar una residualidad menor.

MALEZAS QUE CONTROLA

YUYO COLORADO

(*Amaranthus quitensis*, *Amaranthus hybridus*)

RAMA NEGRA

(*Conyza bonariensis*, y *Conyza sumatrensis*)

HERBICIDA

Dinamic[®]
70 WDG

DINAMIC es ideal para controlar los flujos de nacimientos de malezas durante el barbecho intermedio, superponiendo luego con una aplicación en pre-siembra o pre-emergencia del cultivo de soja con un PPO, ej: Flumioxazin.

Superponiendo herbicidas residuales, localidad Pampa Del Infierno, Chaco.
Aplicación secuencial: Dinamic 45 DAS, Flumioxazin en pre-emergencia del cultivo.



90 DDA (Días desde aplicación).
400 g/ha Dinamic - 150 cc/ha Flumioxazin

LOTE LIMPIO AL MOMENTO DE LA SIEMBRA, SOJA EMERGIDA SIN COMPETENCIA

Localidad Gutemberg, Córdoba



TESTIGO




DINAMIC 50 DDA
320 g/ha

EXCELENTE CONTROL DE MALEZAS DIFÍCILES



RAMA NEGRA con síntomas de control con Dinamic



YUYO COLORADO con síntomas de control con Dinamic



DINAMIC 70 WDG POSICIONAMIENTO EN SOJA



Dinamic se recomienda para aplicaciones en barbechos intermedios 45 días antes de la siembra de soja (400 g/ha suelos medios a pesados), con una aplicación posterior de un pre-emergente como Flumioxazin. Esta superposición de residuales permite al cultivo llegar a cubrir el surco sin competencia.

OpenAg™

Una red agrícola abierta que alimenta un crecimiento sostenible para todos.

Sin límites, ni fronteras.



www.upl-ltd.com/ar

PELIGRO, SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.